

## Nati dal 2001 al 2011

3° mese

1° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),  
Haemophilus influenzae b (Hib) (vaccino esavalente)

1° dose: pneumococco (vaccino contro la meningite da pneumococco)

5° mese

2° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),  
Haemophilus influenzae b (Hib) (vaccino esavalente)

2° dose: pneumococco (vaccino contro la meningite da pneumococco)

11° mese

3° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),  
Haemophilus influenzae b (Hib) (vaccino esavalente)

3° dose: pneumococco (vaccino contro la meningite da pneumococco)

13°-15° mese

1° dose: morbillo, parotite, rosolia (vaccino trivalente)  
meningococco C (vaccino contro la meningite di tipo C)

5-6 anni\*

4° dose (richiamo): difterite, tetano, pertosse, polio

2° dose: morbillo, parotite, rosolia (vaccino trivalente)

15-16 anni\*

5° dose (richiamo): difterite, tetano, pertosse

Le vaccinazioni contro **pneumococco** e **meningococco C** sono state introdotte in Piemonte nel 2010; ai fini del nuovo Decreto sull'obbligo vaccinale, non sono obbligatorie per i bambini nati dal 2001 al 2011

**5-6 anni e 15-16 anni\*:**

**le vaccinazioni previste in queste fasce di età normalmente sono effettuate a 5-6 anni (entro il compimento del 7° anno) e durante il 15° anno (entro il compimento dei 16 anni)**