

Nati dal 2012 al 2016

3° mese

**1° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),
Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

1° dose: pneumococco (vaccino contro la meningite da pneumococco;
non obbligatorio)

5° mese

**2° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),
Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

2° dose: pneumococco (vaccino contro la meningite da pneumococco;
non obbligatorio)

11° mese

**3° dose: difterite, tetano, pertosse, polio, epatite B (HBV),
Haemophilus influenzae b (Hib)** (vaccino esavalente)

3° dose: pneumococco (vaccino contro la meningite da pneumococco;
non obbligatorio)

13°-15° mese

1° dose: morbillo, parotite, rosolia (vaccino trivalente)
meningococco C (vaccino contro la meningite di tipo C)

5-6 anni*

4° dose (richiamo): difterite, tetano, pertosse, polio

2° dose: morbillo, parotite, rosolia (vaccino trivalente)

5-6 anni*:

**Le vaccinazioni previste in questa fascia di età normalmente sono effettuate a
5-6 anni (entro il compimento del 7° anno)**